



PDI®

**CENTRO DE CAPACITACIÓN
PROFESIONAL**

CONDICIONES DE SALUD INCOMPATIBLES PARA INGRESAR AL CURSO DE FORMACIÓN DE AGENTES POLICIALES, CONDUCTENTE A LA CARRERA DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN LABORES INVESTIGATIVAS Y CONTROL MIGRATORIO

“Las cuales se encuentran reguladas en la
Orden General N° 2.480, de fecha 09.DIC.016, Anexo N° 6”.

PDI
CENTRO DE CAPACITACIÓN
PROFESIONAL

POLICÍA DE INVESTIGACIONES
ADMISIÓN CECAPRO
admision.cecapro@investigaciones.cl

 cecapro_pdi
 www.cecapro.cl



METABÓLICAS Y GENERALES

Metabólicas y generales	Malformaciones congénitas o adquiridas (incluidas cicatrices) con repercusión estética evidente y/o funcional moderada a severa.	x
	Tumores malignos o cáncer de cualquier tipo y/o ubicación hasta alta definitiva.	x
	Enfermedades autoinmunes	x
	Adenopatías sospechosa de malignidad	x
	Anemia (hemoglobina ≤ 10 mg/dl) persistente luego de tratamiento por mínimo 2 semanas con fierro.	x
	Alteración patológica persistente de hemograma: trombocitopenia, trombocitosis o serie blanca con signos de malignidad.	x
	Enfermedades venéreas: sífilis y/o condilomas extensos.	x
	Sobrepeso % grasa corporal (> de 27% eb mujer o > de 20% en hombres) o IMC ≥ 27%	x

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Otorrinolaringología	Otitis media crónica	x
	Hipoacusia moderada a severa	x
	Rinitis atrófica	x
	Insuficiencia velopalatina	x
	Sinusitis crónica	x
	Poliposis nasal	x
	Papilomatosis laríngea	x
	Amigdalitis hipertrófica obstructiva	Sin corrección quirúrgica
	Desviación obstructiva de septum nasal	Sin corrección quirúrgica
	Trastorno severo de la voz	x



OFTALMOLOGÍA

Oftalmologia	Miopia, hipermetropia y/o astigmatismo > 1 dioptria con lentes	x
	Retinopatía de todo tipo	x
	Maculopatías de todo tipo	x
	Daltonismo en todos sus grados (independiente de agudeza visual)	x
	Estrabismo de todo tipo que afecte la simetría ocular	x
	Insuficiencia de convergencia voluntaria o forzada	x
	Alteración de glándulas lagrimales hipo o hiperfuncionantes	x
	Glaucoma de todo tipo	x
	Nistagmo en cualquier presentación	x
	Hemeralopia	x
	Defectos del campo visual	x
	Catarata	x
	Malformaciones mono o binoculares del globo ocular o cavidad ósea ocular y/o palpebral	x

PULMONARES

Pulmonares	Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar actual o con secuelas	x
	Asma bronquial	x
	Limitación crónica del flujo aéreo	x
	Tumor pulmonar o mediastínico	x
	Hemo y/o neumotórax no traumáticos	x



ABDOMINALES Y GASTROINTESTINALES

Abdominales y Gastrointestinales	Hidatidosis	x
	Hernia de pared abdominal	x
	Higado graso severo	x
	Alteración significativa de pruebas hepáticas Transaminasas sobre 50 U/ml Protrombina < 70%	x
	Hepatitis crónica	x
	Pancreatitis	x
	Enfermedad inflamatoria intestinal	x
	Colelitiasis	x
	Antecedentes de hemorragia digestiva alta o baja	x

GINECOLÓGICAS

Ginecológicas	Infección por virus inmunodeficiencia adquirida	x
	Metrorragia severa actual	x
	Tumor uterino > 5 cm	x
	Tumores anexiales > de 6 cm o sospechosos de malignidad.	x
	Tumor mamario benigno > de 2 cm.	x
	Dolor pélvico crónico > 2 años	x
	PAP atípico, lesiones pre y cancerosas cervicouterinas	x
	Embarazo	x



NEFROLÓGICAS

Nefrológicas	Insuficiencia renal (VFG < 60 ml/min)	x
	Condición de monorreno (a)	x

UROGENITALES

Urogenitales	Fimosis	No resuelta hasta el termino del proceso
	Quiste espermático > 15 mm.	x
	Varicocele	x
	Hidrocele	x
	Nefro y/o urolitiasis	x
	Hematuria ≥ 10 glóbulos rojos por campo	x
	Estrechez uretral	x
	Hipospadia peneana mayor	x
	Adenoma prostático	x
	Infección de tracto urinario bajo que no corresponde a tratamiento antibiótico	x



TRAUMATOLÓGICAS

Traumatológicas	Afecciones de columna lumbar (discopatías, protrusiones o hernias discales, espondilosis, espondilolistesis) como antecedente o producto de evaluación clínica.	x
	Escoliosis con ángulo de Cobb ≥ 20°	x
	Cifosis dorsal ≥ 45°	x
	Lordosis lumbar ≥ 60° (L1 - S1)	x
	Desnivel pélvico > a 1,5 cm	x
	Genu valgo con distancia intermaleolar ≥ 6 cm.	x
	Genu varo con distancia intercondílea ≥ 6 cm.	x
	Hallux valgus con ángulo metatarsfalángico ≥ 20°	x
	Pie plano moderado a severo	x
	Pie cavo moderado a severo	x
	Pie bot	x
	Sindactilia o polidactilia que afecta la función de la mano	x
	Ausencia o alteración funcional de dedos pulgar y/o índice	x
	Rigidez, deformidad o pérdida de un dedo que afecte la función de la mano	x
	Osteitis u osteomielitis activas o secuelas	x
	Artritis, artrosis o anquilosis de cualquier articulación	x
	Luxación congénita o adquiridas recidivantes de cualquier articulación	x
	Amputación de un segmento de extremidad superior o inferior que afecte la funcionalidad de la extremidad	x



NEUROLÓGICAS

Neurológicas	Temblores	x
	Alteración de la marcha	x
	Epilepsia o crisis convulsiva	x
	Accidente cerebro vascular o crisis isquémico transitoria	x
	Malformaciones cerebro vasculares	x
	Enfermedad de Parkinson	x
	Cuociente intelectual bajo	x
	Secuela de déficit atencional del adulto	x

ENDOCRINOLÓGICAS

Endocrinológicas	Dislipidemia (colesterol total > 240, colesterol LDL > 160 mg/dl y/o triglicéridos > 500)	x
	Diabetes Mellitus	x
	Patología tiroidea no neoplásica	x



REUMATOLÓGICAS

Reumatológicas	Artritis reumatoidea	x
	Gota	x
	Mesenchimopatías	x
	Enfermedades autoinmunes	x

SALUD MENTAL Y PSIQUIÁTRICAS

Salud mental y Psiquiatría	Trastorno ansioso severo	x
	Trastorno adaptatipo severo	x
	Trastorno limitrofe de la personalidad o Borderline	x
	Depresión leve	x
	Depresión moderada - severa	x
	Depresión monopolar, forma recurrente	x
	Trastorno afectivo bipolar	x
	Antecedente de trastorno psicótico	x
	Alcoholismo, drogadicción (o abuso de sustancias)	x
	Esquizofrenia	x
	Secuelas psicológicas de traumatismo o daño orgánico cerebral.	x